



Le Temps
1205 Genève
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'802
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 729.006
N° d'abonnement: 729006
Page: 10
Surface: 19'710 mm²

Le cancer décimera les femmes en 2030

ÉPIDÉMIOLOGIE La maladie pourrait tuer 5,5 millions de femmes par an d'ici à quinze ans. Une hausse de près de 60% par rapport à 2012

Après les maladies cardiovasculaires, les cancers constituent la deuxième cause de mortalité féminine dans le monde. À l'horizon 2030, 5,5 millions de femmes pourraient décéder tous les ans de cette maladie, selon un rapport rendu public mardi lors du Congrès mondial du cancer, réuni à Paris jusqu'à jeudi.

Des efforts accrus en matière d'éducation et de prévention sont essentiels pour endiguer ce fléau grandissant, responsable de la mort de 3,5 millions de femmes en 2012 (sur plus de 8 millions de morts au total), majoritairement dans les pays en développement. «Le poids du cancer augmente dans les pays à revenus faibles et moyens en raison du vieillissement et de la croissance de la population», a indiqué Sally Cowal, de la Société américaine du cancer qui a compilé ces données avec le soutien du laboratoire pharmaceutique allemand Merck KGaA. Cette hausse est aussi attribuée à «l'augmentation de la prévalence [fréquence, ndlr] des facteurs de risque de cancer connus liés à la transition économique rapide comme l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, l'obésité et des facteurs reproductifs». Comme le fait d'avoir un premier enfant à un âge tardif, l'un des facteurs de risque du cancer du sein.

Décès évitables

Bon nombre des plus de 700000 décès annuels par cancers du poumon et du col de l'utérus pourraient en outre être prévenus grâce à une lutte efficace contre le tabagisme, la vaccination et le dépistage. Le cancer du sein, le plus fréquent, est la cause principale de mort par cancer chez les femmes dans le monde, avec 1,7 million de cas diagnostiqués et 521900 décès en 2012.

Le cancer du poumon suit avec 491200 morts annuelles parmi les femmes. Plus de 80% de ces cancers sont attribuables au tabagisme aux Etats-Unis et en France, et 40% en Afrique subsaharienne. Parmi les autres facteurs de risque pour ce cancer figure la pollution intérieure (cuisine et chauffage au charbon ou au bois), responsable de 1,6 million de décès de femmes dans le monde en 2010.

Le cancer du col de l'utérus est responsable pour sa part de près de 266000 morts chaque année. Pour ce cancer, «près de 90% des décès dans le monde surviennent dans les pays en développement. L'Inde à elle seule compte pour 25% du total des cas», souligne encore le rapport. L'Afrique subsaharienne, l'Amérique centrale et du Sud, ainsi que l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est ont les taux de nouveaux cas et de mortalité les plus élevés pour ce cancer. Selon les auteurs, la vaccination protégeant contre les papillomavirus 16 et 18 pourrait éviter la majorité des cas de cancer du col de l'utérus.

Autre problème: l'accès aux traitements et au dépistage reste largement problématique, notamment pour le cancer du sein dans les pays en développement. Le rapport relève des «pénuries» en matériel de radiothérapie en Afrique et en Asie du Sud-Est où environ 30 pays n'ont pas de services de radiothérapie. ■ AT/ST